

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS- PA

Deliane Silva de Souza¹; Cléa Nazaré Carneiro Bichara²; Cláudia Cristina Corrêa Macedo³; Jackson Nunes da Silva⁴

¹Acadêmica de Ciências Naturais - Biologia; ²Doutora em Agentes Infecciosos e Parasitários; ³Especialista em Microbiologia Clínica; ⁴Graduado em de Ciências Naturais - Biologia

delibio76@gmail.com

Universidade do Estado do Pará (UEPA); Universidade Federal do Pará (UFPA)

Introdução: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença que ocorre principalmente em países ou regiões pobres do cenário mundial afetando em média 88 países. Os fatores que desencadeiam a disseminação da doença baseiam-se no fluxo migratório das pessoas ligado a fatores socioeconômicos, que junto com a ação antrópica tem favorecido a degradação ambiental. **Objetivos:** Investigar o perfil epidemiológico dos pacientes acometidos pela Leishmaniose Tegumentar Americana no município de Paragominas/Pará no período 2007 a 2011. Identificar casos de acordo com gênero e faixa etária; Distribuir casos de LTA no município de Paragominas-PA, de acordo com a escolaridade dos indivíduos notificados e descrever as formas clínicas notificadas, e a evolução dos casos. **Métodos:** A coleta foi feita através das variáveis de interesse sobre casos de LTA notificados pelo município de Paragominas-PA a partir dos dados disponíveis na base de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA) e Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas. Estes dados são considerados oficiais e alimentados a partir da Ficha de Notificação de Leishmaniose do Sistema Nacional de Notificação (SINAN), preenchidas no período entre 2007 e 2011 no estado do Pará. **Resultado:** No período do estudo, foram notificados 741 casos, cujo perfil predominante observado foi: pacientes do sexo masculino (653); de baixa escolaridade (275); com 20-39 anos (405); que desenvolveram sobretudo a forma cutânea da doença (731); concluindo o tratamento com cura (448). **Conclusão:** A LTA é uma realidade na área de abrangência do estudo, que possivelmente tem sua prevalência relacionada aos fortes impactos ambientais sofridos no município nos últimos anos possivelmente por alterações no equilíbrio ecológico, socioeconômico e ocupacional que possibilitaram a disseminação dos vetores permitindo o contato mais próximo do homem com áreas de transmissão da doença. É imprescindível, portanto, que sejam fortalecidas as ações de controle, sobretudo ambiental, e de educação em saúde, através do compromisso e atuação dos órgãos governamentais e representatividade da sociedade civil, com metas de redução do número de casos de LTA neste município.

Palavras-chaves: Leishmaniose Tegumentar Americana, Epidemiologia, Paragominas.