

INCIDÊNCIA DE INTERNAÇÕES POR FRATURA DE FÊMUR EM IDOSOS DE JANEIRO A JUNHO DE 2014 EM HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

Amanda de Queiroz Afonso¹; Geciara dos Santos Barbosa¹; Larissa Salgado de Oliveira²

¹Acadêmica de Fisioterapia; ²Mestre em Fisioterapia

amandaqa1@hotmail.com

Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Introdução: As fraturas de fêmur em idosos representam um sério problema de saúde pública em virtude dos elevados custos econômicos para o tratamento e suas consequências. Está entre as lesões traumáticas mais comuns entre idosos, apresentando elevado índice de mortalidade e morbidade. Geralmente essas fraturas são causadas por traumas pequenos e não intencionais, como quedas de própria altura, sua incidência aumenta com a idade e é mais frequente no sexo feminino. Estima-se que 6.000.000 indivíduos no mundo irão sofrer fratura de fêmur em 2050. Diante disso, é importante implementar medidas de prevenção e controle das complicações e doenças associadas, como também a assistência precoce para redução dos agravos, mortalidade e incapacidade funcional dos pacientes acometidos por esse tipo de lesão. **Objetivo:** Determinar o número de internações de pacientes idosos de janeiro a junho de 2014 atendidos na rede de hospitais do SUS com fratura de fêmur no Estado do Pará, assim como identificar o número de pacientes que evoluíram a óbito, no mesmo período. **Metodologia:** A pesquisa possui caráter secundário, descritivo, retrospectivo e transversal, na qual foi analisada a incidência de fraturas de fêmur em pacientes entre 60-79 anos de janeiro a junho de 2014 atendidos na rede de hospitais do SUS, a partir de consulta ao Banco de Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). O referencial teórico foi elaborado a partir de arquivos científicos resgatados no Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os resultados foram organizados em tabelas por meio do programa Bioestat 5.0. **Resultado/Discussão:** No período analisado, foram registradas 247 internações por fratura de fêmur em idosos, destes 105 são pacientes do sexo masculino (42,51%) e 142 do sexo feminino (57,49%). Do total de internações, 4 evoluíram a óbito. Segundo dados do mesmo sistema, essas internações geraram em torno de R\$575.350,84 em gastos públicos, pela utilização de serviços especializados, hospitalizações e medicações. Dentre os principais fatores que levam ao aumento da incidência das fraturas de fêmur em idosos estão a presença de osteoporose, bem como a maior incidência de doenças que afetam o controle postural e equilíbrio resultando nas quedas. Portanto, a Fisioterapia tem papel importante na prevenção de quedas, avaliando os riscos no ambiente em que o idoso está inserido e tratando das alterações decorrentes do avanço da idade. **Conclusão:** Mediante os índices de fratura de fêmur nessa população evidencia-se a necessidade de aperfeiçoar estratégias de intervenção com vistas à melhoria da atenção a saúde e a adoção de condutas efetivas na prevenção, redução e tratamento dessas lesões traumáticas que geram incapacidade funcional e altas taxas de mortalidade.

Referências:

BORGES, A. E. A. et al. Caracterização das Fraturas do Fêmur em Pacientes de um Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa- PB no Período de 2008/2009. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**. V16, N°04, Ano 2012, p.507-516. Disponível em: <www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/rbcs/article/download/11946/9118>.

FERREIRA, A. C. et al. Incidência e Caracterização de Idosos na Clínica Ortopédica por Fratura de Fêmur, Cáceres MT. **Revista Eletrônica Gestão & Saúde**. Vol.04, Nº02, Ano 2013 p.53-67. Disponível em: <gestaoesaude.unb.br/index.php/gestaoesaude/article/download/395/pdf>.

NETO, J. S. H. et al. Características Epidemiológicas e Causas da Fratura do Terço Proximal do Fêmur em Idosos. **Revista Brasileira de Ortopedia**. V46, Nº06, Ano 2011, p. 660-67. Disponível em: <http://www.rbo.org.br/pdf/46-6/artigo_original_40_47.pdf>.